

Nama : Putri Yulianti
NIM : 1033231057
Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dispepsia
Pada Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 PUSDOKKES
POLRI

ABSTRAK

Latar Belakang: Dispepsia merupakan rangkaian gejala atau sindrom yang merujuk pada saluran pencernaan *gastroduodenal* dengan keluhan nyeri perut bagian atas (*epigastrium*) diketahui bahwa Prevalensi dispepsia di Indonesia mencapai 40-50% dan kasus kejadian dispepsia merupakan 10 penyakit tertinggi di Indonesia serta telah terjadi peningkatan jumlah pasien rawat inap maka perlu pemahaman mengenai faktor penyebab kejadian dispepsia, tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dispepsia di Rumah Sakit Bhayangkara TK 1 PUSDOKKES POLRI.

Metode: Desain penelitian menggunakan desain penelitian *cross sectional* dan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang dilakukan dari bulan Juni-Agustus 2024 di RS Bhayangkara TK 1 PUSDOKKES POLRI.

Hasil: Dari 182 responden diketahui bahwa pasien yang mengalami kejadian dispepsia sejumlah 157 (79,46 %). Berdasarkan data demografi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan gaya hidup pasien mayoritas responden berusia lansia (53,84%), berjenis kelamin perempuan (58,75%), pendidikan rendah (64,6%), tidak bekerja (58,93%), dan gaya hidup kurang baik (81,6 %). Kemudian faktor usia (*p-value*: 0,037; OR: 4,063; 95% CI:), jenis kelamin (*p-value*: 0,033; OR: 5,210; 95% CI:), dan gaya hidup (*p-value*: 0,021; OR: 5,422; 95% CI:), menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian dispepsia (*p-value* < 0,05) sedangkan faktor pendidikan (*p-value*: 0,413; OR: 2,327; 95% CI:) dan faktor pekerjaan (*p-value*: 0,112; OR: 2,188; 95% CI:) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kejadian dispepsia (*p-value* > 0,05)

Kesimpulan: Diketahui bahwa ada hubungan faktor usia, jenis kelamin dan gaya hidup dengan kejadian dispepsia tapi pendidikan dan pekerjaan tidak terdapat hubungan dengan kejadian dispepsia pada pasien.

Kata Kunci: Dispepsia, Usia, Pendidikan, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Gaya Hidup

Daftar Pustaka: 40 buah (2016-2024)

Name : Putri Yulianti
NIM : 1033231057
Title : Factors Related to the Incidence of Dispepsia in Patients at the
Bhayangkara Hospital Tk.1 PUSDOKKES POLRI

ABSTRACT

Background: *Dispepsia is a symptoms that refer to the gastroduodenal digestive tract with complaints of upper abdominal pain (epigastrium). It is known that the prevalence of dispepsia in Indonesia reaches 40-50% and cases of dispepsia are the 10 highest diseases in Indonesia and there has been an increase in the number of hospitalized patients, so it is necessary to understand the factors that cause dyspepsia. The purpose of this study was to analyze the factors related to the incidence of dispepsia at the Bhayangkara Hospital TK 1 PUSDOKKES POLRI..*

Method: *The research design used a cross-sectional research design and sampling using the purposive sampling method, which was carried out from June to August 2024 at the Bhayangkara Hospital TK 1 PUSDOKKES POLRI.*

Results: *Of the 182 respondents, it was found that 178 patients experienced dispepsia (79.46%). Based on demographic data on age, gender, education, occupation and patient lifestyle, the majority of respondents were elderly (53.84%), female (58.75%), low education (64.6%), not working (58, 93%), and poor lifestyle (81.6%). Then the factors are age (p-value: 0.037; OR: 4.063; 95% CI:), gender (p-value: 0.033; OR: 5.210; 95% CI:), and lifestyle (p-value: 0.021; OR: 5.422; 95% CI:), showed a significant relationship with the incidence of dispepsia (p-value < 0.05) while educational factors (p-value: 0.413; OR: 2.327; 95% CI:) and employment factors (p- value: 0.112; OR: 2.188; 95% CI:) does not show a significant relationship with the incidence of dispepsia (p-value > 0.05)*

Conclusion: *it is reported that there is a relationship between age, gender and lifestyle factors with the incidence of dyspepsia, but education and work are not related to the incidence of dispepsia in sufferers..*

Keywords: *Dispepsia incidence, influencing factors*

Reference List: *40 ref (2016-2024)*