

Nama : Intan Apriani
Nim : 1031211041
Judul : ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN YANG MENGALAMI BENIGN
PROTATIC HYPERPLASIA POST TURP DENGAN NYERI AKUT DI RSUD
PASAR REBO JAKARTA

ABSTRAK

Latar belakang : Benign prostatic hyperplasia (BPH), lebih dikenal dengan sebutan hiperplasia prostat jinak, adalah suatu kondisi yang paling sering menyerang pria berusia 40-an dan 50-an. Hiperplasia prostat jinak yang paling sering terjadi pada pria lanjut usia, Penyebab Benign prostatic hyperplasia sampai saat ini belum diketahui dengan pasti tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya Benign prostatic hyperplasia seperti usia, pola hidup, merokok, riwayat mutasi genetik dalam keluarga, dan konsumsi alkohol. **Metode :** penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pada dua kasus yang sama sebagai subjek penelitian pasien dewasa dengan penyakit benign prostatik hyperlansia post trup dengan nyeri akut di RSUD Pasar Rebo Jakarta. Metode pengambilan data yaitu dengan dilakukan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi. Instrumen yang dilakukan untuk pengumpulan data yaitu dengan format pengkajian asuhan keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi DIII Keperawatan Univeristas Mh Thamrin. **Hasil Hasil:** setelah dilakukan tindakan keperawatan yaitu memonitor ttv, mengkaji status nyeri, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, mengidentifikasi skala nyeri memonitor lokasi nyeri, dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik. Dilakukan dengan hasil masalah pada pasien dapat teratasi. **Kesimpulan :** pada pasien Benign Protatic Hyperplasia Post Turp dapat di monitoring agar tidak terjadi nyeri akut

Kata Kunci : Benign Protatic Hyperplasia Post Turp, Nyeri Akut.
Daftar Pustaka : XVIII, (2016-2023).

Nama : Intan Apriani
Nim : 1031211041
*Title : NURSING CARE FOR PATIENTS EXPERIENCED BENIGN
PROTATIC HYPERPLASIA POST TURP WITH ACUTE PAIN AT PASAR REBO RSUD
JAKARTA*

ABSTRACT

Background : Benign prostatic hyperplasia (BPH), better known as benign prostatic hyperplasia, is a condition that most often attacks men in their 40s and 50s. Benign prostatic hyperplasia most often occurs in elderly men. The cause of benign prostatic hyperplasia is currently not known for certain but there are several factors that can increase the risk of benign prostatic hyperplasia such as age, lifestyle, smoking, family history of genetic mutations, and consumption, Alcohol. **Method :** This research uses a case study method. In the same two cases as research subjects, adult patients with benign prostatic disease, post-trup hyperopia with acute pain at Pasar Rebo Regional Hospital, Jakarta. Data collection methods include interviews, observation, physical examination, documentation studies. The instrument used for data collection was a shelter assessment format in accordance with the applicable provisions in the DIII Nursing Study Program, Mh Thamrin University. **Results :** After the killing was carried out, namely monitoring the TV, assessing pain status, teaching deep breathing relaxation techniques, identifying the pain scale, monitoring the location of the pain, and collaborating with the doctor in administering analgesics. This results in the patient's problem being resolved. **Conclusion :** Benign Prostatic Hyperplasia Post Turp patients can be monitored to avoid acute pain.

Keywords : Post Turp Benign Prostate Hyperplasia, Acute Pain.

Bibliography : XVIII, (2016-2023).