

UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Fakultas Kesehatan

Skripsi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan

Semester Ganjil 2023/2024

HUBUNGAN POSISI MENERAN DENGAN RUPTUR PERINEUM DI TPMB E DAN TPMB Y DESA MARGASUKA KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG PERIODE

JANUARI- FEBRUARI 2024

ELIK ERNAWATI 10532210012

ABSTRAK

Latar belakang : Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi baik ibu maupun janin Apabila posisi meneran yang dilakukan tidak benar terjadi laserasi perineum. *ruptur perineum* merupakan kejadian robeknya otot *perineum* selama proses persalinan. Tujuan untuk mengetahui hubungan posisi meneran dengan *ruptur perineum*.

Metode : Desain Penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Proses penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 Januari hingga 12 Februari 2024 di TPMB E dan TPMB Y jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 28 responden. Hasil penelitian menunjukkan ruptur perineum sebanyak 11 responden (39,2%). Dari 2 responden yang mengalami ruptur perineum dengan posisi setengah duduk, 9 responden dengan posisi litotomi. Dan responden yang tidak mengalami *ruptur perineum* sebanyak 17 (60,8%).

Hasil : Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa $p = 0,01 < 0,05$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antaran posisi meneran ibu bersalin dengan *ruptur perineum* di di TPMB E dan TPMB Y Tahun 2024. hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada hubungan antara posisi meneran dengan *ruptur perineum* ibu bersalin.

Kata Kunci : Posisi Meneran dan Ruptur Perineum

UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Fakultas Kesehatan

Skripsi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan

Semester Ganjil 2023/2024

HUBUNGAN POSISI MENERAN DENGAN RUPTUR PERINEUM DI TPMB E DAN TPMB Y DESA MARGASUKA KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG PERIODE

JANUARI- FEBRUARI 2024

ELIK ERNAWATI 10532210012

ABSTRACT

Background: Childbirth is a series of processes that end with the mother expelling the products of conception. Normal labor and birth is the process of expelling a fetus that occurs in a full-term pregnancy, spontaneous birth with a back of the head presentation without complications for both mother and fetus. If the menstrual position is carried out incorrectly, perineal lacerations occur. Perineal rupture is the tearing of the perineal muscles during the birth process. The aim is to determine the relationship between meneran position and perineal rupture.

Method: Quantitative research design using a cross-sectional approach. This research process was carried out from January 6 to February 12 2024 at TPMB E and TPMB Y. The number of samples used in this research was 28 respondents. The research results showed perineal rupture in 11 respondents (39.2%). Of the 2 respondents who experienced perineal rupture in a half-sitting position, 9 respondents were in the lithotomy position. And 17 respondents (60.8%) did not experience perineal rupture.

Results: The results of the Chi-square test show that $p = 0.01 < 0.05$, meaning that there is a significant relationship between the birthing position of the mother and perineal rupture in TPMB E and TPMB Y in 2024. The results of the research show that there is a relationship between the menstrual position and perineal rupture in pregnant women.

Keywords: Meneran Position and Perineal Rupture