

Nama : Nanda Nurmala Putri

NIM : 10033231042

Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB IUD Di Poli Kebidanan Bhayangkara TK I Pusedokkes Polri

ABSTRAK

Pendahuluan: Kontrasepsi IUD (*Intra Uterine Device*) atau AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversible dan berjangka panjang, dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif, dengan tujuan kontrasepsi atau usaha pencegahan kehamilan. **Tujuan:** Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB IUD Di Poli Kebidanan Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusedokkes Polri. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. **Hasil :** Responden usia subur yang menggunakan IUD sebanyak 40 orang (80%) dan yang tidak menggunakan IUD 10 orang (20%), sedangkan responden usia tidak subur yang menggunakan KB IUD sebanyak 10 orang (20%). Nilai *p-value* pada penelitian ini sebesar 0,952 dengan nilai OR 0,432. Responden primipara yang menggunakan IUD sebanyak 10 orang (20%), multipara sebanyak 25 orang (50%), sedangkan responden grande multipara yang menggunakan IUD sebanyak 15 orang (30%). Nilai *p-value* pada penelitian ini sebesar 0,520, dengan nilai OR 0,380. **Kesimpulan :** Tidak terdapat hubungan usia terhadap penggunaan KB IUD dan Tidak ada hubungan paritas terhadap penggunaan KB IUD.

Kata Kunci : KB, IUD, Paritas, Usia

Name : Nanda Nurmala Putri
Student ID : 1033231042
Title : Factors Associated with the Use of IUD Contraceptives at the Obstetrics Clinic of Bhayangkara Hospital TK I Puskor Polri

ABSTRACT

Introduction : The Intrauterine Device (IUD) or Long-Acting Reversible Contraceptive (LARC) is a highly effective, reversible, and long-term contraceptive device inserted into the uterus that can be used by all women of reproductive age for the purpose of contraception or preventing pregnancy. **Objectives** : The aim of this study is to identify the factors associated with the use of IUD contraceptives at the Obstetrics Clinic of Bhayangkara Hospital TK I Puskor Polri. **Methods** : The research method used is quantitative. **Results** : Among fertile respondents, 40 individuals (80%) used an IUD, while 10 individuals (20%) did not. Among infertile respondents, 10 individuals (20%) used an IUD. The *p*-value in this study is 0.952, with an Odds Ratio (OR) of 0.432. Among primipara respondents, 10 individuals (20%) used an IUD, while 25 multipara respondents (50%) and 15 grand multipara respondents (30%) also used an IUD. The *p*-value in this study is 0.520, with an OR of 0.380. **Conclusion** : There is no relationship between age and the use of IUD contraceptives, and there is no relationship between parity and the use of IUD contraceptives.

Keywords : Contraception, IUD, Parity, Age