

Nama : Mey Christiany
NIM : 1031222225
Judul : Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Sectio Caesarea Dengan Menyusui Tidak Efektif Di RS Tk. II Moh Ridwan Maureksa Jakarta

ABSTRAK

Latar Belakang: Menyusui tidak efektif merupakan masalah yang dialami oleh ibu pasca partum yang dapat menyebabkan ketidak puasan pada bayi serta mempengaruhi perkembangan otak dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pijat oksitosin sebagai salah satu cara meningkatkan produksi ASI. Upaya Promotif yang dilakukan yaitu perawat melakukan penyuluhan kesehatan kepada ibu atau pasien tentang pentingnya ASI dan cara menyusui dengan benar, upaya preventif yang akan dilakukan yaitu perawat mengajarkan ibu tentang cara perawatan payudara dan pijat oksitosin, upaya kuratif yang akan dilakukan yaitu mengkolaborasi dengan tim medis atau dokter saat ASI tidak keluar dan memberikan obat-obatan, vitamin, nutrisi yang seimbang buat ibu yang menyusui, suplemen nutrisi untuk memperlancar ASI, upaya rehabilitative yang akan dilakukan yaitu menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara dan pijat oksitosin supaya tidak terjadi pembengkakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami menyusui tidak efektif selama 3x24 jam **Metode:** Metode yang digunakan adalah studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi terhadap dua partisipan **Hasil:** Diagnosa keperawatan prioritas yang ditemukan pada pasien 1 dan pasien 2 adalah menyusui tidak efektif. Tindakan keperawatan yang akan dilakukan yaitu perawatan payudara dan pijat oksitosin supaya tidak terjadi pembengkakan. Pada tahap evaluasi, ditemukan perbedaan hasil, dimana pada pasien 1 masalah menyusui tidak efektif teratasi, sedangkan pada pasien 2 masalah tersebut belum teratasi sepenuhnya. **Kesimpulan:** Tidak semua ibu post partum section caesarea mengalami menyusui tidak efektif yang sama. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung lain seperti anomali payudara (puting susu terbalik) pada 2 responden, payudara bengkak, suplai ASI tidak memadai, dan kurangnya paparan informasi.

Kata Kunci : Menyusui tidak efektif, ibu post partum
Data Pustaka : XIX (2016-2023)

Name : Mey Christiany
NIM : 1031222225
Title : *Nursing Care for Postpartum Cesarean Section Patients Experiencing Ineffective Breastfeeding at RS Tk. II Moh Ridwan Maureksa Jakarta Timur*

ABSTRACT

Background: *Ineffective breastfeeding is a problem experienced by postpartum mothers that can cause dissatisfaction in babies and affect brain development and the nutrition needed by the body. To overcome this problem, oxytocin massage is needed as one way to increase breast milk production. Promotive efforts carried out are nurses conducting health education to mothers or patients about the importance of breast milk and how to breastfeed properly, preventive efforts that will be carried out are nurses teaching mothers about how to care for their breasts and oxytocin massage, curative efforts that will be carried out are collaborating with the medical team or doctor when breast milk does not come out and providing medicines, vitamins, balanced nutrition for breastfeeding mothers, nutritional supplements to facilitate breast milk, rehabilitative efforts that will be carried out are helping mothers with breast care and oxytocin massage to prevent replacement.* **Objective:** *This study aims to carry out maintenance maintenance in patients who experience ineffective breastfeeding for 3x24 hours* **Method:** *The method used is a case study. Data were obtained through interviews, observations, physical examinations, and documentation studies of two participants.* **Results:** *Priority diagnoses found in patients 1 and 2 are ineffective breastfeeding. The surgical procedures to be performed include breast care and oxytocin massage to prevent engorgement. During the evaluation phase, differences in outcomes were found, with patient 1's ineffective breastfeeding problem resolved, while patient 2's problem remained unresolved.* **Conclusion:** *Not all postpartum mothers with cesarean sections experience the same ineffective breastfeeding. This variation is influenced by several other contributing factors, such as breast anomalies (inverted nipples) in two respondents, breast swelling, inadequate breast milk supply, and lack of exposure.*

Keywords : *neffective breastfeeding, postpartum mothers*
Bibliography : *XXVII (2015-2025)*