

Nama : Ali Imron
NIM : 1031211004
Judul : Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Yang Mengalami Skizofrenia Dengan Risiko Perilaku Kekerasan Di Ruang Edelweis Dua Rskd Duren Sawit

ABSTRAK

Latar belakang: Penyakit mental yang dikenal sebagai skizofrenia ditandai dengan keterpisahan dari kenyataan, penarikan diri dari interaksi sosial, dan fragmentasi pikiran, persepsi, dan proses berpikir. Berperilaku galak merupakan suatu kondisi tanda perasaan dan kemarahan yang tampak dalam struktur nyata. **Tujuan penelitian** Penulis mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia yang cenderung melakukan perilaku kekerasan. **Metode** studi kasus digunakan dalam karya ilmiah ini. Informan penelitian ini adalah dua orang pasien di RSKD Duren Sawit yang memberikan informasi melalui wawancara. Informasi berbeda diperoleh dari persepsi, penilaian aktual, studi laporan dan tulisan. Hasil dari studi laporan dan tulisan di jadikan satu menjadi askep Menurut hasil pengkajian yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 19 februari 2024 faktor prediposisi yang dialami pasien 1 dan pasien 2 yaitu faktor psikologis dan faktor lingkungan. kemudian tanda dan gejala yang muncul pada pasien 1 yaitu pasien Pasien saat berbicara dengan nada tinggi, tegas dan cepat, Pasien tampak mudah tersinggung dan kontak mata berkurang saat diajak berbicara dan pasien tampak kurang percaya diri lalu pasien 2 pun mengalami kesamaan tanda gejala dan ada yang membedakannya yaitu pasien mengatakan tidak mau memulai pembicaraan dengan orang lain, mudah curiga pada saat di wawancara, Pasien tampak lesu tidak bersemangat selanjutnya mekanisme koping pada pasien 1 yaitu pasien mampu mengatasi masalah dengan baik, sedangkan pada pasien 2 pasien kurang mampu mengatasi masalah dengan baik. Selanjutnya perbedaan pada penatalaksanaan pada kedua pasien. Pada pasien 1 mendapatkan obat berupa olanzapine 1 X 5mg (pagi), clorilex 1 X 25mg, trihexyphenidyl 1 X 2mg, olanzapine 1X10mg (malam), sedangkan pasien 2 mendapatkan trihexyphenidyl 2 X 2 mg, olanzapine 1x10mg, dan clorilex 2x25mg. **Kesimpulan** dari studi kasus ini penulis mendapatkan hasil pada pasien 1 dan pasien 2 mampu melakukan SP 1 sampai dengan SP 4 yaitu kedua pasien mampu mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, apa yang dilakukan, dan akibat dari perilaku kekerasan, lalu melatih pasien cara mengontrol marah dengan latihan fisik, minum obat dengan benar, verbal dan spiritual. pada kedua pasien mengalami kemampuan peningkatan dan penurunan gejala risiko perilaku kekerasan dengan baik

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan Jiwa, Risiko perilaku kekerasan, Skizofrenia Daftar Pustaka : XXXVIII (2013 – 2022)

Nama : Ali Imron

Nim : 1031211004

Judul : Mental Nursing Care For Patients Experienced With Schizophrenia With
A Risk Of Violent Behavior In Edelweis Room Two Rskd Duren Sawit

ABSTRACT

Background: A mental illness known as schizophrenia is characterized by detachment from reality, withdrawal from social interaction, and fragmentation of thoughts, perceptions, and thought processes. Aggressive behavior is a condition of feelings and anger that appear in real structures. Research objectives. The author is able to provide nursing care to schizophrenia patients who tend to engage in violent behavior. The case study method is used in this scientific work. The informants of this study were two patients at RSKD Duren Sawit who provided information through interviews. Different information was obtained from perceptions, actual assessments, report studies and writing. The results of the report and writing studies were combined into nursing care. According to the results of the assessment conducted on February 12-19, 2024, the predisposing factors experienced by patients 1 and 2 were psychological factors and environmental factors. then the signs and symptoms that appear in patient 1 are patient The patient speaks in a high tone, firmly and quickly, The patient appears easily offended and eye contact is reduced when spoken to and the patient appears less confident then patient 2 also experiences similar signs and symptoms and there are some that differentiate them namely the patient says he does not want to start a conversation with other people, is easily suspicious when interviewed, The patient appears lethargic and unenthusiastic then the coping mechanism in patient 1 is that the patient is able to deal with problems well, while in patient 2 the patient is less able to deal with problems well

Furthermore, there are differences in the management of the two patients. Patient 1 received medication in the form of olanzapine 1 X 5mg (morning), clorilex 1 X 25mg, trihexyphenidyl 1

Keywords : Mental Health Nursing Care, Risk of Violent Behavior, Schizophrenia

Bibliography: XXXVIII (2013 – 2022)